

KARATOS (M)

Deutsches Weidelgras

Das tetraploide, frühe Deutsche Weidelgras Karatos überzeugt durch seine guten Ausdauerereigenschaften mit der Note 6 für das Merkmal Ausdauer und mit der Note 4 bei der Neigung zu Auswinterung. Die hohe Ertragsleistung erreicht Karatos in den Folgeschnitten (Note 7). Mit der Note 6 im Merkmal Narbendichte bewegt sich die Sorte auf dem Niveau der diploiden frühen Deutschen Weidelgräser der Beschreibenden Sortenliste. Karatos hat die Auszeichnung „M“ für besonders gut auf Moorstandorten geeignete Gräser erhalten (Stand BSA 2013).

- Gute Ausdauer (Note 6 Ausdauer, Note 4 Neigung zur Auswinterung)
- Hohe Ertragsleistung in den Folgeschnitten (Note 7)
- Geringe Rostanfälligkeit

| Karatos | | spz. Standorteignung: | | Moor | | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|-----------------------|--|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Reife: früh | | Ploidie: tetraploid | | | | | | | |
| | | BSA-Einstufung: | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Wachstum | Ährenschieben | | | ■ | | | | | | | |
| | Massebildung im Anfang | - | | | | ■ | | | | | + |
| | Neigung zu Lager | + | | | | ■ | | | | | - |
| Agronomik | Narbendichte | - | | | | | | ■ | | | + |
| | Ausdauer | - | | | | | | ■ | | | + |
| | Neigung zu Auswinterung | + | | | | | ■ | | | | - |
| Ertrag | Anfälligkeit für Rost | + | | | ■ | | | | | | - |
| | TM Gesamt | - | | | | ■ | | | | | + |
| | TM 1. Schnitt | - | | ■ | | | | | | | + |
| Qualität | TM weitere Schnitte | - | | | | | | ■ | | | + |
| | Blütenstandsformation im Nachwuchs | + | | | ■ | | | | | | - |

■ Notenspektrum BSA-Liste 2018
1 = sehr früh / kurz / fehlend / gering / niedrig

■ Einstufung Bundessortenamt
9 = sehr spät / lang / stark / hoch

| | Baden-Württemberg | Bayern | Mittelgebirge | Nord-Ost | Nord-West |
|-------------|-------------------|--------|---------------|----------|-----------|
| Grünland | X | | X | X | X |
| Ackerfutter | X | | X | | X |